

AVERTISSEMENTS AGRICOLES



STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

 MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE
 DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE
 ET DE LA FORÊT

 SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX
 Ancienne Conserverie de CASAMOZZA
 LUCCIANA - 20290 - BORGO -

95.36.05.70



EDITION CORSE

 Bulletin Technique N° 120
 du 17 Mai 1988

VIGNE

**** Mildiou**

Après les fortes pluies de ces derniers jours (jusqu'à 140 mm à BASTIA, mais seulement 15 mm à SAN GIULIANO et 7 mm à SOLENZARA) des repiquages sont à craindre. Des conditions météorologiques instables, alternant ondées et montées de température sont annoncées et des foyers de mildiou ont déjà été observés sur toute la plaine orientale.

--> Un renouvellement du traitement s'avère indispensable dans les zones déjà traitées. Préférez pour ce traitement des produits systémiques qui assurent la protection des organes formés après le traitement ; si la pression du mildiou se poursuit, maintenez une cadence de **14 jours**.

:	:
:	:
:	Attention = Pensez à ne pas faire plus de
:	trois traitements aux anilides pendant la
:	saison
:	:

--> Pour les parcelles n'ayant reçu aucun traitement, une première intervention doit-être réalisée rapidement.

**** Tordeuses de la grappe**

Le vol de première génération se termine - Attendre un prochain avis pour intervenir.

P.142

CULTURES MARAICHIERES

**** Mildiou sur pomme de terre**

Les conditions météorologiques sont très favorables. Un traitement s'impose dès maintenant . Vous pouvez utiliser :

- des produits de contact

à base de captafol, chlorothalonil, cuivre, folpel, manébe, mancozèbe, metirame de zinc, propinébe, zinébe et associations.
Persistance d'action 7 jours. Renouveler le traitement après 25 mm de pluies.

- des produits pénétrants

à base de cymoxanil . La persistance d'action est de 9 jours entre deux applications avec ce type de produit.

- des produits systémiques

PATAFOL, PULSAN, SIRDATE, ACYLON P . La protection peut aller jusqu'à 14 jours entre deux applications de ce type de produit sauf pour Patafol (10 j)

OLIVIERS

**** Cycloconium ou oeil de paon**

Cette maladie est favorisée par les conditions climatiques humides . Intervenez avec un produit à base de cuivre 250 g de cuivre métal/hl.

CERISIER

**** Mouche de la cerise**

--> Les premières captures de mouche de la cerise ont été obtenues le 16 mai en MARANA .

--> Un traitement contre les adultes de la mouche de la cerise pourra être réalisé dès le 23 mai avec de la deltaméthrine (DECIS)

--> Vous pouvez également effectuer un traitement avec un produit larvicide à la fin du mois.

<u>Spécialités commerciales</u>	<u>Matière active</u>	<u>délai avant récolte</u>	<u>g.MA</u>
Nombreuses spécialités	diméthoate	7 jours	30
ANTHIO - FORT	formothion	7 jours	50
MALIXOL, L50 inodore, ZITHIOL liquide	melathion	7 jours	100
BASUDINE	diazinon	15 jours	30
LEBAYCID	denthion	15 jours	50